



# BIJENGIDSJE



Ontdek de bijen en hommels  
die in het voorjaar in je tuin vliegen

**TIP**

Gebruik dit  
Bijengidsje voor  
de Nationale  
Bijentelling!

**Nationale  
Bijentelling**

In actie voor de bij



## INLEIDING

In Nederland komen ruim 350 bijensoorten voor. In dit gidsje staan de bijen die in het voorjaar in je tuin vliegen. Deze gids helpt je bij het herkennen van de bijen en hommels in je tuin of op je balkon. Het boekje is bedoeld voor de periode maart tot half mei. Na half mei wordt de kans groter dat je een soort tegenkomt die niet in dit boekje staat. Ook verschijnen later in het jaar de mannetjes van hommels en die zien er vaak net wat anders uit dan de vrouwtjes die in dit boekje staan. Naast bijen staan in dit boekje ook drie soorten zweefvliegen die erg op bijen lijken.

### Herkenning

Bijen zijn er in vele soorten en maten. Hommels zijn grote, dikke bijen met een wollige, kleurrijke beharing. Andere bijen zijn juist klein, slank en bijna kaal. De kleuren variëren van helemaal zwart of

metaalgroen tot bontgekleurd met rode, witte of gele vlekken. Bijen zijn dus niet altijd zwartgeel gestreept!

Het is best lastig om bijen te onderscheiden van zweefvliegen en wespen. Sommige zweefvliegen lijken door hun beharing sterk op bijen. Hiermee profiteren ze van de angst die vogels hebben voor bijen en hommels. Toch zijn er een paar uiterlijke verschillen. Zweefvliegen hebben bijvoorbeeld maar twee vleugels, bijen hebben er vier. Dit is niet altijd makkelijk om te zien omdat de voor- en achtervleugels van bijen vaak over elkaar liggen, waardoor het lijkt alsof ze twee vleugels hebben. Je kunt ook naar de lengte van de voelsprietten op de kop kijken: bijen hebben lange sprietten, zweefvliegen meestal korte. Ook hebben bijen kaken onderaan hun kop, vliegen hebben alleen een tong.

### Colofon

---

Tekst: Vincent Kalkman & Menno Reemer  
Tekeningen: Jeroen de Rond





Een groot verschil tussen bijen en wespen is de beharing. Veel bijen hebben lange haartjes, wespen zijn veel kaler. Ook hebben bijen vaak een bosje extra lange haren aan hun achterpoten, waarmee ze stuifmeel verzamelen. Bij sommige bijen zitten deze speciale haren aan de onderkant van hun achterlijf. Wespen hebben nooit zulke lange haren aan de poten of het achterlijf. Er zijn echter ook bijen die niet in dit boekje staan (zoals wespbijen en maskerbijen) die bijna kaal zijn en een zwart met geel, wit of rood kleurenpatroon hebben, waardoor ze erg op wespen lijken. Ook het gedrag verraadt veel. Bijen verzamelen stuifmeel op bloemen en brengen dat naar hun nest. Wespen doen dit niet, zij voeden zich met dierlijk voedsel. Een insect met een prooi is dus nooit een bij en een insect dat stuifmeel verzamelt is nooit een wesp.



## Levenswijze

Bijen houden van zon en van bloemen. Je vindt ze dus vooral in open, bloemrijke landschappen, zoals graslanden, tuinen en heidevelden. In parken en bossen zijn ze vooral te vinden op open plekken.

Vrouwelijke bijen verzamelen stuifmeel, dat ze naar hun nest brengen. Op dit stuifmeel leggen ze hun eitjes, waaruit larven komen die zich met het stuifmeel voeden. Sommige bijensoorten zijn heel kieskeurig en verzamelen alleen stuifmeel van één bepaalde bloemensoort.

Bijen bouwen hun nesten op uiteenlopende plekjes en manieren. Veel soorten nestelen in zelf gegraven gangen in de grond. Andere bijen

nestelen in gangetjes die door kevers in dood hout geknaagd zijn, of in holle stengels van bijvoorbeeld vlier of braam. Behangersbijen 'behangen' hun nestwanden met stukjes blad, terwijl metselbijen zelf tussenwandjes metselen van leem. Koekoekshommels zijn een stuk luijer: zij maken zelf geen nest, maar profiteren van de nesten die andere hommels bouwen. Het vrouwtje van de koekoekshommel dringt zo'n nest binnen, doodt de rechtmatige koningin en laat vervolgens de werksters voor haar eigen eieren zorgen.

De meeste bijensoorten leven alleen (solitair). Slechts enkele soorten, zoals hommels en de honingbij, leven in sociale volken.

## ZWEEFVLIEG OF BIJ?

### ZWEEFVLIEG

1 paar vleugels  
korte voelsprieten

### BIJ

2 paar vleugels  
lange voelsprieten





### Doe mee met de Nationale Bijentelling!

Dit boekje is speciaal gemaakt voor het herkennen van bijen die je in je tuin kunt vinden tijdens de Nationale Bijentelling, die jaarlijks in de tweede helft van april wordt gehouden. Meedoen is makkelijk, je hoeft geen bijenexpert te zijn. Elke bij telt, jij ook?

#### Bijen zoeken

Bijen zijn makkelijk te vinden door op bloemen te kijken. Al in het vroege voorjaar vliegen de eerste bijen op wilgenkatjes, en in de herfst zijn ze op bloeiende klimop te vinden. Nesten van bijen zijn moeilijker te vinden. Hiervoor moet je geluk en wat ervaring hebben. Het geluk is wel een handje te helpen door een bijenhotel op te hangen, of door zelf zo'n mooie nestplaats van hout en holle stengels te maken.

#### Meer weten?

Op Bestuivers.nl is veel informatie te vinden over het herkennen van bijen en hun levenswijze. Zo vind je hier hulpmiddelen voor het herkennen van bijen die later in het jaar in de tuin te vinden zijn.

Kom je in het voorjaar een bij tegen die niet in dit gidsje staat? Geef je waarneming dan door op Waarneming.nl.

# 16 SOORTEN

## BIJEN, HOMMELS EN ZWEEFVLIEGEN

die in het voorjaar in je tuin vliegen



**Meer informatie: [www.nationalebijentelling.nl](http://www.nationalebijentelling.nl)**



## ROSSE METSELBIJ

(vrouw)

*Osmia bicornis*

**Herkenning** Vrij grote (8-10 mm), breedgebouwde bij met dichte beharing en zwakke metaalglans. Vrouwtje met zwart behaarde kop en uiteinde achterlijf, lichtbruin borststuk. Voorste helft achterlijf rossig behaard, buik met dichte rode beharing ('buikschuier'). Verwarring mogelijk met vosje, maar die is op onderzijde borststuk en achterlijf geheel zwart behaard.

**Voorkomen** Algemeen en wijd verspreid in heel Nederland.

**Leefgebied** Allerlei terreinen met enige bomen, struweel of bebouwing. Veel in stedelijk gebied en bij bosranden.

**Nestelwijze** Nestelt in dood hout en holle stengels, ook in muurspleten en andere kunstmatige holten, zelfs in sleutelgaten. Wordt regelmatig gezien in 'bijenhôtels'.

**Vliegtijd** Vliegt van maart tot en met juni, met een piek in april en mei.



## VOSJE

(vrouw)

*Andrena fulva*


**Herkenning** Het vrouwtje (10-11mm) is makkelijk te herkennen aan de lange, dichte, vosrode beharing op de bovenkant van borststuk en achterlijf, in combinatie met de zwartbehaarde kop en onderzijde van borststuk en achterlijf. Verwarring kan optreden met rosse metselbij, maar bij deze zijn de haren op de onderzijde van borststuk en achterlijf licht gekleurd.

**Voorkomen** Algemeen en verspreid over heel Nederland.

**Leefgebied** Veel in stedelijk gebied waar ze te vinden is in tuinen, plantsoenen en parken; buiten het stedelijk gebied te vinden langs bosranden, ruigten en (spoor)dijken.

**Nestelwijze** Nestelt in zelfgegraven gangen in de grond.

**Vliegtijd** Vliegt vroeg in het voorjaar. Wordt vanaf maart waargenomen en bereikt in april al zijn piek.



## GEHOORNDE METSELBIJ

(vrouw)

*Osmia cornuta*

**Herkenning** Het vrouwtje is wollig behaard met een zwarte kop en borststuk en een geheel rood behaard achterlijf. Het dier lijkt een beetje op de rosse metselbij maar die heeft een grijsig behaard borststuk en heeft een donkere achterlijfspunt. Pas op voor verwarring met de steenhommel. De naam slaat op de twee hoorntje op de voorkant van de kop, maar pas op, die zijn ook aanwezig bij de rosse metselbij.

**Voorkomen** Algemeen in het zuiden en zuidoosten van het land. De soort wordt snel algemener en zal zich waarschijnlijk komende jaren op veel plekken in het westen en noorden van het land vestigen.

**Leefgebied** Komt vooral voor in stedelijk gebied, veel in tuinen.

**Nestelwijze** Nestelt in gaatjes in de muur of holle stengels. Maakt veel gebruik van bijenhôtels.

**Vliegtijd** Maart tot mei, vooral algemeen in april.



## ROODGATJE

(vrouw)

*Andrena haemorrhoa*

**Herkenning** Vrouwtje (8-10mm) met oranjebruin behaard borststuk en glimmend zwart achterlijf met oranjerode achterlijfspunt; achterschelen oranje. Deze combinatie van kenmerken komt bij andere 'tuinbijen' niet voor.

**Voorkomen** Algemeen en verspreid over heel Nederland.

**Leefgebied** Allerlei terreinen, vooral waar struweel aanwezig is, zoals bosranden, duinen, heidegebieden, landbouwgebieden en stedelijk gebied.

**Nestelwijze** Nestelt in zelfgegraven gangen in de grond.

**Vliegtijd** Vliegt vroeg in het voorjaar van maart tot in juni, met een piek eind april / begin mei.



## GEWONE SACHEMBIJ

(vrouw & man)

*Anthophora plumipes*

**Herkenning** Grote (14-16 mm), breedgebouwde bij met dichte beharing. Bij het vrouwtje komen twee kleurvormen voor: een grijsgeel behaarde met een zwart behaarde achterlijfspunt, en een zwart behaarde met oranjerode beharing van de achterschelen. Het mannetje heeft een heldergele voorzijde van de kop en is onmiskenbaar door de lange zwarte pluimpjes aan de middenpoten.

**Voorkomen** Algemeen en wijd verspreid in heel Nederland.

**Leefgebied** Allerlei biotopen, zoals tuinen, parken, bosranden, rivieroeveren en industrieterreinen. Bezoekt allerlei bloemen. In tuinen vaak te zien op longkruid.

**Nestelwijze** Nestelt op zonnige plaatsen in de bodem en in wanden of muren, graag in leem.

**Vliegtijd** Vliegt vroeg in het voorjaar van maart tot in mei, met een piek in april.



Lichte variant, vrouw

Donkere variant, vrouw

Man

## HONINGBIJ

(vrouw & man)

*Apis mellifera*

**Herkenning** Vrij grote (9-14mm), donkerbruine bij, vaak met gedeeltelijk oranje achterlijf. Op het achterlijf (langs de voorranden van de segmenten) zijn grijswitte dwarsbandjes te zien die in het midden niet onderbroken zijn. Van gelijkende bijensoorten te onderscheiden door de behaarde ogen, de geheel donkere poten en de grijswitte bandjes op het achterlijf.

**Voorkomen** Zeer algemeen in heel Nederland.

In Nederland komen honingbijen niet in het wild voor. Alleen volken die door imkers in bijenkasten worden gehouden en verzorgd.

**Nestelwijze** Nestelt in Nederland vrijwel uitsluitend in bijenkasten van imkers. Bij hoge uitzondering vestigen aan imkers ontsnapte volken zich wel eens in een holle boom of oude schuur.

**Vliegtijd** Werksters van honingbijen kunnen vrijwel het gehele jaar gezien worden, zelfs op warme, zonnige winterdagen.



## VILTVLEKZANDBIJ

(vrouw)

*Andrena nitida*

**Herkenning** Het vrouwtje is een grote (12-15 mm) zandbij met oranjebruin behaard borststuk en glimmend zwart achterlijf, met langs de zijkant vlekken van korte, witte beharing. Verschilt van gelijkende soorten door de zwarte schenen van de achterste poten, de zwarte achterlijfspunt en het glimmend zwarte achterlijf met witte haavlekken.

**Voorkomen** Algemeen en verspreid over heel Nederland, één van de weinige zandbijen die ook in de zeekleigebieden algemeen is. Minder algemeen op de zandgronden.

**Leefgebied** Allerlei terreinen, zoals bosranden, duinen, heide- en landbouwgebieden en stedelijk gebied.

**Nestelwijze** Nestelt in zelfgegraven gangen in de grond.

**Vliegtijd** Vliegt vroeg in het voorjaar van maart tot in juni, met een piek eind april / begin mei.



## TUINHOMMEL

(vrouw)

*Bombus hortorum*

**Herkenning** Het borststuk is zwart behaard met zowel aan voor- als achterzijde een gele band. Het achterlijf is geel behaard aan de voorzijde, zwart op het midden en wit aan de achterlijfspunt. Andere hommelseorten met dit kleurenpatroon komen niet voor in tuinen. Wel is verwarring mogelijk met aardhommel & veldhommel, die echter de gele band aan de achterzijde van het borststuk missen.

**Voorkomen** Algemeen en wijd verspreid in heel Nederland, maar meestal in lage aantallen.

**Leefgebied** Allerlei open en beboste landschappen. Heeft vanwege de lange tong een sterke voorkeur voor planten met lange bloembuizen, zoals lipbloemen (dovenetel, rode klaver), smeerwortel en vingerhoedskruid.

**Nestelwijze** Nestelt op of vlak onder de grond. Kolonies tellen 50-120 werksters.

**Vliegtijd** Koninginnen die overwinteren, vliegen in maart en april. De nieuwe generatie koninginnen vliegt samen met de mannetjes van mei tot in augustus. Werksters vliegen van mei tot in september.



## VELDHOMMEL & AARDHOMMEL

(vrouw)

*Bombus lucorum/ Bombus terrestris*

**Herkennen** De veldhommel en aardhommel hebben een zwart behaard borststuk met gele band aan de voorzijde, en een achterlijf met een gele voorzijde, zwarte middenband en geheel witte achterlijfspunt. In tuinen zijn deze soorten te verwarren met de tuinhommel, die echter aan de achterzijde van het borststuk een extra gele band heeft.

**Voorkomen** Algemeen en wijd verspreid in heel Nederland.

**Leefgebied** Allerlei open en beboste landschappen.

**Nestelwijze** Nestelen gewoonlijk ondergronds, bij voorkeur in oude hopen van muizen of mollen, tot circa 30 cm diep. Kolonies tellen 100-400 werksters.

**Vliegtijd** Koninginnen die overwinteren, vliegen in maart en april. De nieuwe generatie koninginnen vliegt samen met de mannetjes van mei tot in augustus. Werksters vliegen van mei tot in september.



## WEIDEHOMMEL

(vrouw)

*Bombus pratorum*

**Herkennen** Vrouwtjes van de weidehommel zijn grotendeels zwart met oranjerode achterlijfspunt en een gele band op de voorzijden van het borststuk en vaak ook op het begin van het achterlijf. Ze kunnen verward worden met vrouwtjes van de steenhommel, maar de vrouwtjes van deze soort hebben nooit een gele band op de voorkant van het borststuk.

**Voorkomen** Algemeen en wijd verspreid in heel Nederland.

**Leefgebied** Allerlei open en beboste landschappen. Algemeen in stedelijk gebied.

**Nestelwijze** Nestelt in allerlei holten, zowel boven- als ondergronds, zoals in oude muizenholten en boomholten en schuren. Kolonies tellen 50-120 werksters.

**Vliegtijd** Koninginnen die overwinteren, vliegen van maart tot mei. De nieuwe generatie koninginnen vliegt samen met de mannetjes van mei tot in augustus. Werksters vliegen van mei tot in september.



## STEENHOMMEL

(vrouw)

*Bombus lapidarius*

**Herkennen** Vrouwtjes zijn zwartbehaard met roodbehaarde achterlijfspunt. Kan verward worden met vrouwtjes van de weidehommel, maar die soort heeft een meer oranjegekleurde achterlijfspunt en bijna altijd een gele band op de voorkant van het borststuk.

**Voorkomen** Algemeen en wijd verspreid in heel Nederland.

**Leefgebied** Allerlei open en beboste landschappen.

**Nestelwijze** Nestelt in allerlei holten, zowel boven- als ondergronds, zoals oude muizenholten, nestkastjes en spouwmuren. Kolonies tellen 100-300 werksters.

**Vliegtijd** Koninginnen die overwinteren, vliegen in maart en april. De nieuwe generatie koninginnen vliegt samen met de mannetjes van mei tot in augustus. Werksters vliegen van mei tot in september.



## AKKERHOMMEL

(vrouw)

*Bombus pascuorum*


**Herkennen** Variabel gekleurde hommel. Donkere exemplaren, die in Nederland vooral in het westen voorkomen, hebben een oranje behaard borststuk en een oranje behaarde achterlijfspunt, met verder zwarte beharing. Lichte exemplaren, in Nederland vooral in het oosten, zijn overwegend oranje behaard en hebben ook witachtige haren aan de zijkant van het borststuk. Allerlei tussenvormen komen voor.

**Voorkomen** Algemeen en wijd verspreid in heel Nederland.

**Leefgebied** Allerlei open en beboste landschappen.

**Nestelwijze** Nestelt in allerlei holten, zowel boven- als ondergronds, zoals in graspollen, oude muizenholten en schuren. Kolonies tellen 60-150 werksters.

**Vliegtijd** Koninginnen die overwinteren, vliegen in maart en april. De nieuwe generatie koninginnen vliegt samen met de mannetjes van mei tot in augustus. Werksters vliegen van mei tot in september.





## BOOMHOMMEL

(vrouw)

*Bombus hyporum*


**Herkenning** Onmiskenbare hommelmel door het geheel oranjebruin behaarde borststuk en de wit behaarde achterlijfspunt.

**Voorkomen** Algemeen en wijd verspreid in heel Nederland.

**Leefgebied** Allerlei biotopen, vooral in nabijheid van bos, struweel en bebouwing. Veel in parken en tuinen.

**Nestelwijze** Nestelt graag in boomholten, maar ook in allerlei kunstmatige holten, zoals vogelnestkastjes, spouwmuren, schuren en stallen. Kolonies tellen 80-400 werksters, die bij verstoring van het nest agressief kunnen reageren.

**Vliegtijd** Koninginnen die overwinteren, vliegen in maart en april. De nieuwe generatie koninginnen vliegt samen met de mannetjes van mei tot in augustus. Werksters vliegen van eind april tot in augustus.



## BIJVLIEG

*Eristalis (meerdere soorten)*

**Herkenning** Bijvliegen lijken op bijen en worden vaak verward met de honingbij. Het borststuk is sterk behaard, maar het achterlijf is grotendeels kaal. In tegenstelling tot bijen hebben ze korte antennen en één paar vleugels in plaats van twee. Veel soorten hebben op de eerste paar segmenten op het achterlijf gele vlekken.

De achterpoten zijn veel minder sterk behaard dan die van de meeste bijen.

**Voorkomen** Algemeen in heel Nederland

**Leefgebied** Allerlei biotopen, onder meer veel in tuinen.

**Levenswijze** Larven van bijvliegen leven in water en modder.

**Vliegtijd** Een deel van de soorten overwintert en is vanaf het vroege voorjaar al in tuinen aan te treffen.



## HOMMELBIJVLIEG

*Eristalis intricaria*

**Herkenning** De hommelmelbijvlieg is zowel op het borststuk als op het achterlijf sterk behaard en lijkt daardoor op een hommelmel. In tegenstelling tot bijen en hommels hebben ze korte antennen en één paar vleugels in plaats van twee. Deze vlieg kan makkelijk verward worden met de grote narcisvlieg die ook veel in tuinen voorkomt. Bij de grote narcisvlieg zijn de poten echter geheel zwart, terwijl die bij de hommelmelbijvlieg deels geel zijn. Van deze soort komen verschillende kleurvarianten voor (zie plaatjes).

**Voorkomen** Algemeen in heel Nederland.

**Leefgebied** Allerlei biotopen, onder meer veel in tuinen.

**Levenswijze** Larven van bijvliegen leven in water en modder.

**Vliegtijd** De eerste volwassen dieren vliegen al eind maart. Komt het meest voor van april tot augustus.



## GROTE NARCISVLIEG

*Merodon equestris*

**Herkenning** De grote narcisvlieg is zowel op het borststuk als op het achterlijf sterk behaard en lijkt daardoor op een hommelmel. In tegenstelling tot bijen en hommels hebben ze korte antennen en één paar vleugels in plaats van twee. Deze vlieg kan makkelijk verward worden met de hommelmelbijvlieg die ook veel in tuinen voorkomt. Bij de hommelmelbijvlieg zijn de poten echter deels geel, terwijl die bij de grote narcisvlieg geheel zwart zijn. Van deze soort komen verschillende kleurvarianten voor (zie plaatjes).

**Voorkomen** Algemeen in heel Nederland.

**Leefgebied** Allerlei biotopen, onder meer veel in tuinen.

**Levenswijze** De larve leeft in bolgewassen zoals sneeuwkllokje, narcis en hyacint en komt daardoor ook veel voor in tuinen.

**Vliegtijd** Enkele vroege dieren worden eind april gezien maar de grootste aantallen vliegen in mei en juni.







Als je naar de prachtige illustraties in dit boekje kijkt, valt het meteen op dat er behoorlijk wat verschillende bijen en hommels zijn. In Nederland komen er ruim 350 bijensoorten voor. In dit gidsje staan de bijen die in het voorjaar in je tuin vliegen. Is het een mooie dag? Zet dan een kop thee of koffie, neem dit boekje mee en ga in de tuin bij bloemen of een bijenhotel staan. Binnen de kortste keren herken je de nijvere werkers van je tuin en zie je dat ze allemaal hun eigen favoriete bloemen hebben!

## WAT ZOEMT ER IN JOUW ACHTERTUIN?

Dit Bijengidsje is een handig hulpmiddel voor de Nationale Bijentelling. De Bijentelling wordt jaarlijks in april georganiseerd.

## NATIONALE BIJENTELLING

De Nationale Bijentelling is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.

[www.nationalebijentelling.nl](http://www.nationalebijentelling.nl)

**Nationale  
Bijentelling**

In actie voor de bij

